

Plodina alebo okolnosti		sady, vrátene čerešne, rod slivka ( <i>Prunus</i> spp.)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		vrzivka ovocná ( <i>Ceratitis capitata</i> ) vrzivka čerešňová ( <i>Rhagoletis cerasi</i> )
Formulácia	Typ	VP – pripravok (pásy, doštičky, odparníky) uvoľňujúce účinnú látku vo forme pary
	Koncentrácia účinných látok g/l	40
Aplikácia	Druh metódy	umiestnené vo fyzických pasciach
	Počet (min., max.)	hromadný odchyt do pascí: 1 pasca na strom až 100 pascí/ha
	Interval medzi aplikáciami (min.)	cca 6 až 8 týždňov*
Aplikačná dávka na ošetrovanie	kg účinných látok/hl (min., max.) kg/hl	max. 4
	Voda l/ha (min., max.)	hromadný odchyt do pascí: max 100
	kg účinných látok/ha (min., max.) kg/ha	hromadný odchyt do pascí: max 4
Celková dávka	kg účinných látok/ha (min., max.) kg/ha	hromadný odchyt do pascí: max 4
Ochranná lehota		nie je dôležitá

\*v závislosti od faktorov životného prostredia, ako je klíma a topografia