

Použitie proti hmyzu

Plodina alebo okolnosti		ovocné stromy jablň domáca <i>(Malus domestica)</i> slivka domáca <i>(Prunus domestica)</i> broskyňa obyčajná <i>(Prunus persica)</i> ríbezľa červená <i>(Ribes rubrum)</i> orech <i>(Juglans sp.)</i> čerešňa <i>(Prunus sp.)</i>	
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli	
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		voška broskyňová (<i>Myzus persicae</i>) voška ružová (<i>Macrosiphum rosae</i>) vlnačka krvavá (<i>Eriosoma lanigerum</i>) voška ríbezľová (<i>Cryptomyzus ribis</i>) stromárka orechová (<i>Callaphis juglandis</i>) voška čerešňová (<i>Myzus cerasi</i>)	
Macerát z príhľavy	formulácia	DC – dispergovateľný koncentrát*	
	obsah účinnej látky	75 g/l (čerstvá príhľava) alebo 15 g/l (suchá hmota)	
Aplikácia	druh metódy	postrek priamo na vošky	
	rastová fáza a obdobie	jar – leto do zberovej zrelosti, plody vhodné na zber (BBCH 87)	
	počet za vegetáciu (min., max.)	1 – 5	
	interval medzi aplikáciami (min.)	min. 7 dní, bežne 15 dní	
Dávka postreku		300 – 900 l/ha**	
Príprava postreku	pri dávke postreku	300 l	900 l
	macerát z príhľavy	60 l	180 l
	voda	240 l	720 l
Ochranná doba		7 dní	
Poznámky		Preventívne ošetrovanie je neefektívne.	
		Stačí 24 hodín macerácie pri 20 °C.	

*Macerát je rastlinný homogenát extrahovaný studenou vodou, filtrovaný (na použitie 5-násobne riedený).

**Pri príprave postreku dodržať 5-násobné riedenie macerátu, pomer riedenia je 1:4 (1 diel macerátu + 4 diely vody).