

Plodina alebo okolnosti		ľuľok zemiakový (<i>Solanum tuberosum</i>)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		alternáriová škvrnitosť zemiakov (<i>Alternaria porri</i> f. sp. <i>solani</i>)
Extrakt z cibule <i>Allium cepa</i> L.	formulácia	DC – Dispergovateľný koncentrát (odvar)
	obsah účinnej látky	50 g/l
Aplikácia	druh metódy	postrek
	rastová fáza a obdobie	prvý bazálny bočný výhonok viditeľný (> 5 cm) (BBCH 21) až plody v 1. plodenstve okrovej alebo hnedastej farby (BBCH 85)
	počet za vegetáciu (min., max.)	3 – 5
	interval medzi aplikáciami (min.)	7 dní
Príprava postreku	extrakt z cibule <i>Allium cepa</i> L.	6 – 10 l/ha*
	voda	600 – 1 000 l/ha
Ochranná doba		žiadna

*Obsah cibule *Allium cepa* L. v odporúčanej aplikačnej dávke je 0,3 – 0,5 kg/ha pre ľuľok zemiakový.