

Plodina alebo okolnosti		jablň domáca (<i>Malus domestica</i>)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		škodcovia na plodoch ako obaľovač jablňný (<i>Cydia pomonella</i>)
Fruktóza	formulácia	SP – prášok rozpustný vo vode
	obsah účinnej látky	998 – 1 000 g/kg
Aplikácia	druh metódy	postrek*
	rastová fáza a obdobie	od jari, začiatku otvárania púčikov, pred objavením sa prvých zelených špičiek listov (BBCH 6) do leta, plného kvitnutia, 50 % kvetov otvorených, prvé okvetné lupienky opadávajú (BBCH 65)
	počet za vegetáciu (min., max.)	5 – 7
	interval medzi aplikáciami (min.)	21 dní
Aplikačná dávka	fruktóza	0,06 – 0,10 kg/ha
	voda	600 – 1 000 l/ha
Celková dávka	kg účinných látok/ha (min., max.)	0,3 – 0,7 g/ha
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		Nepriame pôsobenie, žiadne priame insekticídne účinky – elicitor, zvyšovanie odolnosti (obranyschopnosti) rastlín.

*Aplikácia skoro ráno pred 9. hodinou (slniečno). Postrek sa pripravuje tesne pred aplikáciou.