

Plodina alebo okolnosti		vinič hroznorodý (<i>Vitis vinifera</i>)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		múčnatka viniča (<i>Uncinula necator</i>)
Kravské mlieko	formulácia	SL – kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
	obsah účinnej látky	1000 g/l
Aplikácia	druh metódy	postrek
	rastová fáza a obdobie	od začiatku otvárania očiek, ojedinele sú viditeľné zelené končeky zárodokov (BBCH 07) do úplne rozvinutých zárodokov súkvetí, púčiky kvetov sa začínajú oddeľovať zo stlačenej polohy, dĺžka výhonku dosahuje 68 – 80 cm (BBCH 57)
	počet za vegetáciu (min., max.)	3 – 6
	interval medzi aplikáciami (min.)	6 – 8 dní
Aplikačná dávka	kravské mlieko v l/hl postreku	10 – 40 l/hl
	kravské mlieko	10 – 120 l/ha*
	voda	100 – 300 l/ha*
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		Neaplikovať, ak je ktorákoľvek rastlina v neskoršom štádiu rastu ako BBCH 57.

*Zvolený vyšší objem kravského mlieka pri zvolenej dávke vody je potrebné zohľadniť pri nastavení postrekovača (napr. 80 litrov kravského mlieka + 120 litrov vody, celková dávka 200 litrov postreku).