

Plodina alebo okolnosti		ovocné stromy ako jablň domáca (<i>Malus domestica</i>) broskyňa obyčajná (<i>Prunus persica</i>)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		múčnatka jabloňová (<i>Podosphaera leucotricha</i>) kučeravosť broskyňových listov (<i>Taphrina deformans</i>)
Lecitíny	formulácia	EC – emulzný koncentrát
	obsah účinných látok	990 – 1 000 g/kg
Aplikácia	druh metódy	postrek
	rastová fáza a obdobie	od konca nalievania listových pupeňov: pupeňových listeňov svetlo sfarbených a z veľkej časti husto pokrytých chĺpkami (BBCH 03) do veľkosti plodu 90 % z konečnej veľkosti (BBCH 79)
	počet za vegetáciu (min., max.)	3 – 12
	interval medzi aplikáciami (min.)	5 dní
Aplikačná dávka	lecitíny	0,075 kg/hl
	lecitíny	0,375 – 0,750 kg/ha
	voda	500 – 1 000 l/ha
Ochranná doba		5 dní