

Plodina alebo okolnosti		uhorka siata (<i>Cucumis sativus</i>) tekvica obyčajná (<i>Cucurbita pepo</i>)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		G – použitie v skleníkoch
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		múčnatka uhorková (pôvodcovia ochorenia napr.: <i>Podosphaera xanthii</i> , <i>Podosphaera fusca</i> , <i>Podosphaera fuliginea</i> , <i>Golovinomyces cichoracearum</i> , <i>Golovinomyces orontii</i> , <i>Leveillula cucurbitacearum</i> , príp. iní pôvodcovia)
Srvátka	formulácia	TC – technický materiál
	obsah účinných látok	60 – 80 g/l
Aplikácia	druh metódy	postrek*
	rastová fáza a obdobie	od troch týždňov po sejbe, 9. list vyvinutý na hlavnej stonke (BBCH 19) do 9 alebo viac viditeľných primárnych bočných výhonkov (BBCH 49)
	počet za vegetáciu (min., max.)	3 – 5
	interval medzi aplikáciami (min.)	7 dní
Aplikačná dávka	srvátka	6 – 30 l/ha
	voda	1 000 – 1 500 l/ha
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		Nepoužívať, ak je akákoľvek rastlina v skleníku v neskoršom štádiu rastu ako BBCH 49. Srvátka by sa mala použiť ihneď po odbere, neuskladňovať v kovovej nádobe

*Postrek realizovať za slnečného počasia (najlepšie ráno).