

Plodina alebo okolnosti		jahoda záhradná (<i>Fragaria x Ananassa</i>) ostružina malinová (<i>Rubus idaeus</i>)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli G – použitie v skleníkoch
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		múčnatka jahôd (<i>Podosphaera aphanis</i>) červená hniloba koreňa jahody (<i>Phytophthora fragariae</i> var. <i>fragariae</i>) koreňová hniloba maliny (<i>Phytophthora fragariae</i> var. <i>rubi</i>)
Lecitíny	formulácia	EC – emulzný koncentrát
	obsah účinných látok	990 – 1 000 g/kg
Aplikácia	druh metódy	postrek
	rastová fáza a obdobie	od obnovenia rastu (BBCH 10) do konca tvorby plodov (BBCH 89), skorá jar do konca leta (2. zber, druhé jahody dosiahli svoju špecifickú farbu)
	počet za vegetáciu (min., max.)	3 – 12
	interval medzi aplikáciami (min.)	5 dní
Aplikačná dávka	lecitíny	0,2 kg/hl
	lecitíny	0,6 – 1,0 kg/ha
	voda	300 – 500 l/ha
Ochranná doba		žiadna