

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| Plodina alebo okolnosti | | koreniny |
| Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I) | | F – použitie vonku alebo na poli G – použitie v skleníkoch |
| Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov | | patogénne huby a baktérie |
| Chitozán | formulácia | SP – rozpustný prášok |
| | obsah účinných látok | ≥ 85 % chitozánu |
| Aplikácia | druh metódy | postrek* |
| | rastová fáza a obdobie | vzchádzanie: klíčne listy na povrchu pôdy (BBCH 9) do takmer každá rastlina dosiahla konečnú veľkosť, všetky plody dosiahli typickú veľkosť (BBCH 79) |
| | počet za vegetáciu (min., max.) | 4 – 8 |
| | interval medzi aplikáciami (min.) | 2 týždne |
| Aplikačná dávka | chitozán | 0,1 – 0,4 kg/ha |
| | voda | 200 – 400 l/ha |
| Ochranná doba | | žiadna |
| Poznámky | | Nepriame pôsobenie, žiadne priame fungicídne a baktericídne účinky – elicitor, zvyšovanie odolnosti (obranyschopnosti) rastlín Chitozán na použitie je možné pripraviť podľa ktoréhokoľvek z dvoch receptov. |

*Slabá až stredná intenzita postreku. Postrek sa pripravuje tesne pred aplikáciou.