

**Použitie proti hubovým chorobám**

Plodina alebo okolnosti		ovocné stromy <b>jablň domáca</b> <i>(Malus domestica)</i> <b>slivka domáca</b> <i>(Prunus domestica)</i> <b>broskyňa obyčajná</b> <i>(Prunus persica)</i> <b>čerešňa vtáčia</b> <i>(Prunus avium)</i>	
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli	
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		<b>čerň striedavá</b> <i>(Alternaria alternata)</i> <b>monilióza kôstkovín</b> <i>(Monilinia laxa)</i> <b>pleseň sivá</b> <i>(Botrytis cinerea)</i> <b>korenc poplazový</b> <i>(Rhizopus stolonifer)</i>	
Macerát z prhľavy	formulácia	DC – dispergovateľný koncentrát*	
	obsah účinnej látky	75 g/l (čerstvá prhľava) alebo 15 g/l (suchá hmota)	
Aplikácia	druh metódy	postrek	
	rastová fáza a obdobie	jar – leto do plodov vhodných na zber (BBCH 87)	
	počet za vegetáciu (min., max.)	1 – 6	
	interval medzi aplikáciami (min.)	7 – 15 dní	
Dávka postreku		300 – 900 l/ha**	
Príprava postreku	pri dávke postreku	300 l	900 l
	macerát z prhľavy	60 l	180 l
	voda	240 l	720 l
Ochranná doba		7 dní	
Poznámky		-	

\*Macerát je rastlinný homogenát extrahovaný studenou vodou, filtrovaný (na použitie 5-násobne riedený).

\*\*Pri príprave postreku dodržať 5-násobné riedenie macerátu, pomer riedenia je 1:4 (1 diel macerátu + 4 diely vody).