

Plodina alebo okolnosti		<b>jabloň domáca</b> ( <i>Malus domestica</i> )	
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli	
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		hubové choroby na listoch ako <b>chrastavitosť jablák</b> ( <i>Venturia inaequalis</i> ) <b>múčnatka jabloňová</b> ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	
Odvar kôry z vrby	formulácia	DC – dispergovateľný koncentrát*	
	obsah účinnej látky	6,67 g/l	
Aplikácia	druh metódy	postrek**	
	rastová fáza a obdobie	jar, od pučania púčikov: viditeľné kvety obklopené špičkami zelených listov (BBCH 53) do dokvitania: väčšina petál (korunných lupienkov) opadaných (BBCH 67)	
	počet za vegetáciu (min., max.)	2 – 6	
	interval medzi aplikáciami (min.)	7 dní	
Dávka postreku		500 – 1 000 l/ha***	
Príprava postreku	pri dávke postreku	500 l	1 000 l
	odvar kôry z vrby	167 l	333 l
	voda	333 l	667 l
Ochranná doba		žiadna	
Poznámky		Odvar použiť do 24 hodín po príprave.	

\*Odvar získaný horúcou vodou, filtrovaný (na použitie 3-násobne riedený).

\*\*Neaplikovať v prípade vysokej teploty vzduchu.

\*\*\*Pri príprave postreku dodržať 3-násobné riedenie odvaru, pomer riedenia je 1:2 (1 diel odvaru + 2 diely vody).