

Plodina alebo okolnosti		tráva (trávniky), pasienky, mätonoh trváci (<i>Lolium perenne</i>) mätonoh mnohokvetý (<i>Lolium multiflorum</i>) timotejka lúčna (<i>Phleum pratense</i>) „okrasné“ trávy 3AMGC zahŕňajúce aj ozdobnicu čínsku
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli G – použitie v skleníkoch
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		patogénne huby a baktérie
Chitozán	formulácia	SP – rozpustný prášok
	obsah účinných látok	≥ 85 % chitozánu
Aplikácia	druh metódy	postrek*
	rastová fáza a obdobie	vzchádzanie: kľúčnej pošvy (lipnicovité rastliny – trávy), zvinutých listov cez povrch pôdy (ozdobnica čínska) (BBCH 9) do plná zrelosť semien (trávy), prezreté semená (ozdobnica) (BBCH 89)
	počet za vegetáciu (min., max.)	4 – 8
	interval medzi aplikáciami (min.)	2 týždne
Aplikačná dávka	chitozán	0,1 – 0,4 kg/ha
	voda	200 – 400 l/ha
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		Nepriame pôsobenie, žiadne priame fungicídne a baktericídne účinky – elicitor, zvyšovanie odolnosti (obranyschopnosti) rastlín. Chitozán na použitie je možné pripraviť podľa ktoréhokoľvek z dvoch receptov.

*Slabá až stredná intenzita postreku. Postrek sa pripravuje tesne pred aplikáciou.