

Plodina alebo okolnosti		kukurica cukrová (<i>Zea mays</i> subsp. <i>saccharata</i>)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		vijačka kukuričná (<i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.)
Sacharóza	formulácia	SP – prášok rozpustný vo vode
	obsah účinných látok	998 – 1 000 g/kg
Aplikácia	druh metódy	postrek*
	rastová fáza a obdobie	2 listy vyvinuté (BBCH 12) do plnej zrelosti, zrno tvrdé a lesklé, okolo 65 % sušiny (BBCH 89)
	počet za vegetáciu (min., max.)	3 – 4
	interval medzi aplikáciami (min.)	15 dní
Aplikačná dávka	sacharóza	0,02 kg/ha
	voda	200 l/ha
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		Nepriame pôsobenie, žiadne priame insekticídne účinky – elicitor, zvyšovanie odolnosti (obranyschopnosti) rastlín.

*Aplikácia skoro ráno pred 9. hodinou (slnačno). Postrek sa pripravuje tesne pred aplikáciou.