

Plodina alebo okolnosti		vinič hroznorodý (<i>Vitis vinifera</i>)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		múčnatka viniča (<i>Uncinula necator</i>)
Srvátka	formulácia	TC – technický materiál
	obsah účinných látok	60 – 80 g/l
Aplikácia	druh metódy	postrek*
	rastová fáza a obdobie	od začiatku vývinu 1. listu (BBCH 10) do celkom vyvinutej metliny, oddelených kvetov (BBCH 57)
	počet za vegetáciu (min., max.)	3 – 5
	interval medzi aplikáciami (min.)	7 – 10 dní
Aplikačná dávka	srvátka	6 – 30 l/ha
	voda	100 – 300 l/ha
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		Srvátka by sa mala použiť ihneď po odbere, neuskladňovať v kovovej nádobe

*Postrek realizovať za slnečného počasia (najlepšie ráno).

**Nepoužívať, ak je akákoľvek rastlina v neskoršom štádiu rastu ako BBCH 57.

*** Maximálna koncentrácia postreku 10 % (30 l v 300 l)