

Plodina alebo okolnosti		<b>uhorka siata</b> ( <i>Cucumis sativus</i> )
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		G – použitie v skleníkoch
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		<b>múčnatka uhorková</b> (pôvodcovia ochorenia napr.: <i>Podosphaera xanthii</i> , <i>Podosphaera fusca</i> , <i>Podosphaera fuliginea</i> , <i>Golovinomyces cichoracearum</i> , <i>Golovinomyces orontii</i> , <i>Leveillula cucurbitacearum</i> , príp. iní pôvodcovia)  <b>padanie klíčnych rastlín uhorky</b> (pôvodca ochorenia napr. <i>Pythium</i> spp.)
Odvar prasličky	formulácia	DC – dispergovateľný koncentrát*
	obsah účinnej látky	20 g/l
Aplikácia	druh metódy	postrek, zálievky**
	rastová fáza a obdobie	od vyvinutého 9. listu na hlavnej stonke (BBCH 19) do vytvoreného 9. bočného výhonku (BBCH 49)
	počet za vegetáciu (min., max.)	2
	interval medzi aplikáciami (min.)	3 – 4 dní
Dávka postreku		300 l/ha***
Príprava postreku	pri dávke postreku	300 l
	odvar prasličky	30 l
	voda	270 l
Ochranná doba		15 dní
Poznámky		Odvar použiť do 24 hodín po príprave.

\*Odvar je rastlinný homogenát extrahovaný horúcou vodou, filtrovaný (na použitie 10-násobne riedený)

\*\*Neaplikovať v prípade vysokej teploty vzduchu.

\*\*\*Pri príprave postreku dodržať 10-násobné riedenie odvaru, pomer riedenia je 1:9 (1 diel odvaru + 9 dielov vody).