

Plodina alebo okolnosti		vinič hroznorodý (<i>Vitis vinifera</i>)	
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli	
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		peronospóra viniča (<i>Plasmopara viticola</i>) múčnatka viniča (<i>Uncinula necator</i>)	
Odvar kôry z vŕby	formulácia	DC – dispergovateľný koncentrát*	
	obsah účinnej látky	6,67 g/l	
Aplikácia	druh metódy	postrek**	
	rastová fáza a obdobie	jar – leto, od začiatku vývinu 1. listu (BBCH 10) do celkom vyvinutej metliny, oddelených kvetov (BBCH 57)	
	počet za vegetáciu (min., max.)	2 – 6	
	interval medzi aplikáciami (min.)	7 dní	
Dávka postreku		100 – 300 l/ha***	
Príprava postreku	pri dávke postreku	100 l	300 l
	odvar kôry z vŕby	33,3 l	100,0 l
	voda	66,7 l	200,0 l
Ochranná doba		žiadna	
Poznámky		Odvar použiť do 24 hodín po príprave.	

*Odvar získaný horúcou vodou, filtrovaný (na použitie 3-násobne riedený).

**Neaplikovať v prípade vysokej teploty vzduchu.

***Pri príprave postreku dodržať 3-násobné riedenie odvaru, pomer riedenia je 1:2 (1 diel odvaru + 2 diely vody).