

Plodina alebo okolnosti		<b>kukurica siata</b> ( <i>Zea mays</i> )
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		<b>stonožička biela</b> ( <i>Scutigerella immaculata</i> )
Fruktóza	formulácia	SP – prášok rozpustný vo vode
	obsah účinnej látky	998 – 1 000 g/kg
Aplikácia	druh metódy	postrek*
	rastová fáza a obdobie	1. aplikácia: 2 – 3 pravé listy vyvinuté (BBCH 12-13)  2. aplikácia: 4 pravé listy vyvinuté (BBCH 14)
	počet za vegetáciu (min., max.)	2
	interval medzi aplikáciami (min.)	1 – 2 BBCH stupne
Aplikačná dávka	fruktóza	0,008 kg/ha
	voda	82 l/ha
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		Nepriame pôsobenie, žiadne priame insekticídne účinky – elicitor, zvyšovanie odolnosti (obranyschopnosti) rastlín.

\*Aplikácia skoro ráno pred 9. hodinou (slnečno). Postrek sa pripravuje tesne pred aplikáciou.