

Plodina alebo okolnosti		jablň domáca (<i>Malus domestica</i>)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		chrastavitosť jablň (<i>Venturia inaequalis</i>)
Hydrogénuhličitan sodný	formulácia	SP – prášok alebo tuhý koncentrát rozpustný vo vode
	obsah účinnej látky	990 g/kg
Aplikácia	druh metódy	rosenie
	rastová fáza a obdobie	od zelené špičky listov 10 mm nad kvetnými pukmi – myšie uško (BBCH 10) po pokročilé zretie (BBCH 85)
	počet za vegetáciu (min., max.)	1 – 8
	interval medzi aplikáciami (min.)	10 dní
Aplikačná dávka	hydrogénuhličitan sodný	2,5 – 5,0 kg/ha*
	voda	500 – 1 000 l/ha*
Ochranná doba		1 deň
Poznámky		Koncentrácia vyššia ako 1 % môže byť fytotoxická.

*Dávka hydrogénuhličitanu sodného a vody musí byť upravená vzhľadom na odporúčanú koncentráciu postreku 0,5 – 1,0 %. Koncentrácia hydrogénuhličitanu sodného v pripravenom postreku nesmie byť vyššia ako 1 %.