

Plodina alebo okolnosti		<b>tržná zelenina ako uhorka siata</b> ( <i>Cucumis sativus</i> )
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli G – použitie v skleníkoch
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		<b>múčnatka uhorková</b> (pôvodcovia ochorenia napr.: <i>Podosphaera xhantii</i> , <i>Podosphaera fusca</i> , <i>Podosphaera fuliginea</i> , <i>Golovinomyces cichoracearum</i> , <i>Golovinomyces orontii</i> , <i>Leveillula cucurbitacearum</i> , príp. iní pôvodcovia)
Lecitíny	formulácia	EC – emulzný koncentrát
	obsah účinných látok	990 – 1 000 g/kg
Aplikácia	druh metódy	postrek
	rastová fáza a obdobie	od klíčnych listov úplne vyvinutých (BBCH 10) do plnej zrelosti: plody majú farbu typickú pre plnú zrelosť (BBCH 89)
	počet za vegetáciu (min., max.)	2 – 6
	interval medzi aplikáciami (min.)	5 dní
Aplikačná dávka	lecitíny	0,15 kg/hl
	lecitíny	1,50 – 2,25 kg/ha
	voda	1 000 – 1 500 l/ha
Ochranná doba		5 dní