

Plodina alebo okolnosti		<b>kukurica siata</b> ( <i>Zea mays</i> )
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		<b>vijačka kukuričná</b> ( <i>Ostrinia nubilalis</i> Hbn.)
Sacharóza	formulácia	SP – prášok rozpustný vo vode
	obsah účinných látok	998 – 1 000 g/kg
Aplikácia	druh metódy	postrek*
	rastová fáza a obdobie	2 listy vyvinuté (BBCH 12) do začiatku rastu metliny, metlina sa objavuje na vrchole stonky (BBCH 51)
	počet za vegetáciu (min., max.)	3 – 4
	interval medzi aplikáciami (min.)	15 dní
Aplikačná dávka	sacharóza	0,02 kg/ha
	voda	200 l/ha
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		Nepriame pôsobenie, žiadne priame insekticídne účinky – elicitor, zvyšovanie odolnosti (obranyschopnosti) rastlín.

\*Aplikácia skoro ráno pred 9. hodinou (slniečno). Postrek sa pripravuje tesne pred aplikáciou.