

Plodina alebo okolnosti		rajčiak jedlý (<i>Solanum Lycopersicum</i>)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		alternáriová škvrnitosť rajčiakov (<i>Alternaria porri f. sp. solani</i>) septorióza rajčiakov (<i>Septoria lycopersici</i>)
Odvar prasličky	formulácia	DC – dispergovateľný koncentrát*
	obsah účinnej látky	20 g/l
Aplikácia	druh metódy	postrek**
	rastová fáza a obdobie	od 1. súkvetia viditeľného (BBCH 51) do 9. súkvetí viditeľných (BBCH 59) leto
	počet za vegetáciu (min., max.)	2
	interval medzi aplikáciami (min.)	14 dní
Dávka postreku		300 l/ha***
Príprava postreku	pri dávke postreku	300 l
	odvar prasličky	30 l
	voda	270 l
Ochranná doba		15 dní
Poznámky		Odvar použiť do 24 hodín po príprave.

*Odvar je rastlinný homogenát extrahovaný horúcou vodou, filtrovaný (na použitie 10-násobne riedený)

**Neaplikovať v prípade vysokej teploty vzduchu.

***Pri príprave postreku dodržať 10-násobné riedenie odvaru, pomer riedenia je 1:9 (1 diel odvaru + 9 dielov vody).