

Plodina alebo okolnosti		zelenina všetky druhy
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli G – použitie v skleníkoch
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		patogénne huby a baktérie
Chitozán hydrochlorid	formulácia	SP – rozpustný prášok
	obsah účinných látok	100 % chitozán hydrochlorid 1000 g/kg
Aplikácia	druh metódy	postrek*
	rastová fáza a obdobie	od vytvárania listov: od objavenia sa prvého listu (BBCH 10) až do konca tvorby plodov: takmer všetky plody dosiahli typickú veľkosť (BBCH 79)
	počet za vegetáciu	4 – 8
	interval medzi aplikáciami	2 týždne
Aplikačná dávka	chitozán hydrochlorid	0,1 – 0,4 kg/ha
	voda	200 – 400 l/ha
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		Nepriame pôsobenie, žiadne priame fungicídne a baktericídne účinky – elicitor, zvyšovanie odolnosti (obranyschopnosti) rastlín.

*Slabá až stredná intenzita postreku. Postrek sa pripravuje tesne pred aplikáciou.