

Plodina alebo okolnosti	okrasné rastliny pryšec lesný <i>(Euphorbia amygdaloides subsp. Robbiae)</i> magnólia (<i>Magnolia</i>) pryšec Griffithov (<i>Euphorbia griffithii</i>) pajazmín (<i>Philadelphus</i>) buk lesný (<i>Fagus sylvatica</i>) topoľ (<i>Populus</i> spp.) hebe (<i>Hebe</i> spp.) slivka (<i>Prunus</i> sp.) gaultéria (<i>Gaultheria</i>) hruška (<i>Pyrus</i> sp.) javor (<i>Acer</i>) ruža (<i>Rosa</i>) skalník (<i>Cotoneaster</i>) ostružina (<i>Rubus</i>) bršlen (<i>Euonymus</i>) orgován (<i>Syringa</i>) zlatovka (<i>Forsythia</i>) čučoriedka (<i>Vaccinium</i>)	
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)	F – použitie vonku alebo na poli G – použitie v skleníkoch I – použitie v interiéroch	
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov	patogénne huby a baktérie	
Chitozán	formulácia	SP – rozpustný prášok
	obsah účinných látok	≥ 85 % chitozánu
Aplikácia	druh metódy	postrek*
	rastová fáza a obdobie	špičky listov presahujú šupiny (BBCH 9) do plná zrelosť (BBCH 89)
	počet za vegetáciu (min., max.)	4 – 8
	interval medzi aplikáciami (min.)	2 týždne
Aplikačná dávka	chitozán	0,1 – 0,4 kg/ha
	voda	200 – 400 l/ha
Ochranná doba	žiadna	
Poznámky	Nepriame pôsobenie, žiadne priame fungicídne a baktericídne účinky – elicitor, zvyšovanie odolnosti (obranyschopnosti) rastlín.	
	Chitozán na použitie je možné pripraviť podľa ktoréhokoľvek z dvoch receptov.	

*Slabá až stredná intenzita postreku. Postrek sa pripravuje tesne pred aplikáciou.