

Plodina alebo okolnosti		iné ovocné druhy napr. ostružina malinová <i>(Rubus idaeus)</i> ostružina černicová <i>(Rubus plicatus)</i> brusnica obyčajná <i>(Vaccinium vitis-idaea)</i> brusnica čučoriedková <i>(Vaccinium myrtillus)</i>
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		vrtivka ovocná <i>(Ceratitis capitata)</i>
Fosforečnan diamónny	formulácia	prášok rozpustný vo vode
	obsah účinnej látky	990 – 1 000 g/kg
Aplikácia	druh metódy	návnada v pasciach*
	rastová fáza a obdobie	podľa signalizácie
	počet za vegetáciu	podľa potreby
	interval výmeny náplne	cca 6 – 8 týždňov**
Príprava roztoku	koncentrácia	4 %
	fosforečnan diamónny	0,04 kg
	voda	1 l
Ochranná doba		nie je dôležitá

*Hromadný odchyt do pascí: 1 pasca na strom až 100 pascí na hektár.

**V závislosti od faktorov životného prostredia, ako je klíma a topografia.