

Plodina alebo okolnosti		<b>vinič hroznorodý</b> ( <i>Vitis vinifera</i> )
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		<b>cikáda</b> ( <i>Scaphoideus titanus</i> )
Fruktóza	formulácia	SP – prášok rozpustný vo vode
	obsah účinnej látky	998 – 1 000 g/kg
Aplikácia	druh metódy	postrek*
	rastová fáza a obdobie	od 7. pravého listu vyvinutého (BBCH 17) do celkom vyvinutej metliny, oddelených kvetov (BBCH 57)
	počet za vegetáciu (min., max.)	3
	interval medzi aplikáciami (min.)	7 dní
Aplikačná dávka	fruktóza	0,015 kg/ha
	voda	150 l/ha
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		Nepriame pôsobenie, žiadne priame insekticídne účinky – elicitor, zvyšovanie odolnosti (obranyschopnosti) rastlín.

\*Aplikácia skoro ráno pred 9. hodinou (slniečno). Postrek sa pripravuje tesne pred aplikáciou.