

**Použitie proti hmyzu**

Plodina alebo okolnosti		<b>baza červená</b> ( <i>Sambucus racemosa</i> )	
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli	
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		<b>voška bazová</b> ( <i>Aphis sambuci</i> )	
Macerát z prhľavy	formulácia	DC – dispergovateľný koncentrát*	
	obsah účinnej látky	75 g/l (čerstvá prhľava) alebo 15 g/l (suchá hmota)	
Aplikácia	druh metódy	postrek priamo na vošky	
	rastová fáza a obdobie	jar leto	
	počet za vegetáciu (min., max.)	1 – 5	
	interval medzi aplikáciami (min.)	min. 7 dní, bežne 15 dní	
Dávka postreku		400 – 800 l/ha**	
Príprava postreku	pri dávke postreku	400 l	800 l
	macerát z prhľavy	80 l	160 l
	voda	320 l	640 l
Ochranná doba		7 dní	
Poznámky		Preventívne ošetrenie je neefektívne.	
		Stačí 24 hodín macerácie pri 20 °C.	

\*Macerát je rastlinný homogenát extrahovaný studenou vodou, filtrovaný (na použitie 5-násobne riedený).

\*\*Pri príprave postreku dodržať 5-násobné riedenie macerátu, pomer riedenia je 1:4 (1 diel macerátu + 4 diely vody).