

Plodina alebo okolnosti		<b>sója fazuľová</b> ( <i>Glycine max</i> )
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		<b>múčnatka sójová</b> ( <i>Erysiphe diffusa</i> )
Kravské mlieko	formulácia	SL – kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
	obsah účinnej látky	1000 g/l
Aplikácia	druh metódy	postrek
	rastová fáza a obdobie	trojjarmový list na 9. kolenku rozvinutý, bočné výhonky neviditeľné (BBCH 19) do vegetatívne časti pre zber na zeleno dosiahli plný vývin (BBCH 49)
	počet za vegetáciu (min., max.)	3 – 4
	interval medzi aplikáciami (min.)	7 dní
	kravské mlieko v l/hl postreku	18 l/hl
Aplikačná dávka	kravské mlieko	180 – 270 l/ha*
	voda	1 000 – 1 500 l/ha*
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		Neaplikovať, ak je ktorákoľvek rastlina v neskoršom štádiu rastu ako BBCH 49.

\*Zvolený vyšší objem kravského mlieka pri zvolenej dávke vody je potrebné zohľadniť pri nastavení postrekovača (napr. 180 litrov kravského mlieka + 820 litrov vody, celková dávka 1 000 litrov postreku).