

Plodina alebo okolnosti	vinič hroznorodý (<i>Vitis vinifera</i>)	
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)	F – použitie vonku alebo na poli	
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov	peronospóra viniča (<i>Plasmopara viticola</i>)	
Sacharóza	formulácia	SP – prášok rozpustný vo vode
	obsah účinných látok	998 – 1 000 g/kg
Aplikácia	druh metódy	postrek*
	rastová fáza a obdobie	od začiatku vývinu 1. listu (BBCH 10) do celkom vyvinutej metliny, oddelených kvetov (BBCH 57) jar
	počet za vegetáciu (min., max.)	1 – 12
	interval medzi aplikáciami (min.)	7 dní
Aplikačná dávka	sacharóza	0,01 – 0,02 kg/ha
	voda	100 – 200 l/ha
Ochranná doba	žiadna	
Poznámky	Nepriame pôsobenie, žiadne priame fungicídne účinky – elicitor, zvyšovanie odolnosti (obranyschopnosti) rastlín.	

*Aplikácia skoro ráno pred 9. hodinou (slnečno). Postrek sa pripravuje tesne pred aplikáciou.