

Plodina alebo okolnosti		<b>ľuľok zemiakový</b> ( <i>Solanum tuberosum</i> )
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli & G – použitie v skleníku
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		<b>pleseň zemiakov</b> ( <i>Phytophthora infestans</i> )  <b>alternáriová škvrnitosť zemiakov</b> ( <i>Alternaria porri f. sp. solani</i> )  <b>múčnatka uhorková</b> ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )
Odvar prasličky	formulácia	DC – dispergovateľný koncentrát*
	obsah účinnej látky	22,5 g/l
Aplikácia	druh metódy	postrek**
	rastová fáza a obdobie	začiatok klíčenia, klíčky max. 1 mm (BBCH 1) až vzchádzanie, klíčky na povrchu pôdy (BBCH 9)
	počet za vegetáciu (min., max.)	4 – 8
	interval medzi aplikáciami (min.)	5 – 14 dní
Dávka postreku		300 l/ha***
Príprava postreku	pri dávke postreku	300 l
	odvar prasličky	30 l
	voda	270 l
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		Odvar použiť do 24 hodín po príprave.

\*Odvar je rastlinný homogenát extrahovaný horúcou vodou, filtrovaný (na použitie 10-násobne riedený)

\*\*Neaplikovať v prípade vysokej teploty vzduchu.

\*\*\*Pri príprave postreku dodržať 10-násobné riedenie odvaru, pomer riedenia je 1:9 (1 diel odvaru + 9 dielov vody).