

<b>Plodina alebo okolnosti</b>		<b>drobné ovocie</b>
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli G – použitie v skleníkoch
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		<b>patogénne huby a baktérie</b>
Chitozán	formulácia	SP – rozpustný prášok
	obsah účinných látok	≥ 85 % chitozánu
Aplikácia	druh metódy	postrek*
	rastová fáza a obdobie	od vytvárania listov, špičky listov nad pupeňovými listeňmi: prvé listy sa oddelujú (ríbezľa, egreš), prvé listy rozprestreté (malina, černica), objavenie sa prvého listu (jahoda) (BBCH 10) do tvorby plodov, 90 % plodov vytvorených (ríbezľa, egreš, jahoda), takmer všetky mladé plody viditeľné (malina, černica) (BBCH 79)
	počet za vegetáciu (min., max.)	4 – 8
	interval medzi aplikáciami (min.)	2 týždne
Aplikačná dávka	chitozán	0,1 – 0,8 kg/ha
	voda	200 – 400 l/ha
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		Nepriame pôsobenie, žiadne priame fungicídne a baktericídne účinky – elicitor, zvyšovanie odolnosti (obranyschopnosti) rastlín.
		Chitozán na použitie je možné pripraviť podľa ktoréhokoľvek z dvoch receptov.

\*Slabá až stredná intenzita postreku. Postrek sa pripravuje tesne pred aplikáciou.