

Plodina alebo okolnosti		všetky plodiny končeky prstov rukavíc a mechanické rezacie nástroje
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		G – použitie v skleníku I – použitie v interiéri
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		vírusy (mechanicky prenášané) napr. vírus mozaiky tabaku (<i>Tobacco mosaic virus</i> (TMV)), vírus mozaiky rajčiaka (<i>Tomato mosaic virus</i> (ToMV)), vírus miernej škvrnitosti papriky (<i>Pepper mild mottle virus</i> (PMMoV)), vírus zelenoškvritej mozaiky uhorky (<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i> (CGMMV))
Kravské mlieko	formulácia	SL – kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
	obsah účinnej látky	1000 g/l
Aplikácia	druh metódy	dezinfekcia, namáčanie
	počet za vegetáciu (min., max.)	podľa počtu rastlín
	interval medzi aplikáciami (min.)	pred každým kontaktom s novou rastlinou
Aplikačná dávka	kravské mlieko	neuplatňuje sa
	voda	neuplatňuje sa
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		Namáčanie 2 sekundy.
		Mlieko pravidelne vymieňať (napr. po každom riadku zeleniny) na zabránenie krížovej kontaminácii rastlín.