

Plodina alebo okolnosti		ružovité (<i>Rosaceae</i>) rod hloh – všetky druhy (<i>Crataegus</i> spp.) rod muchovník (<i>Amelanchier</i>) rod arónia (<i>Aronia</i>) rod dulovec (<i>Chaenomeles</i>) rod skalník (<i>Cotoneaster</i>) rod dula (<i>Cydonia</i>) rod jabloň (<i>Malus</i>) rod fotínia (<i>Photinia</i>) rod nátržník (<i>Potentilla</i>) rod slivka (<i>Prunus</i>) rod hlohyňa (<i>Pyracantha</i>) rod hruška (<i>Pyrus</i>) rod ruža (<i>Rosa</i>) rod jarabina (<i>Sorbus</i>) rod tavelník (<i>Spiraea</i>)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		spála ružokvetých (<i>Erwinia amylovora</i>)
Ocot	formulácia	kvapalina na dezinfekciu náradia
	obsah účinných látok	80 g/l (8 %)*
Aplikácia	druh metódy	dezinfekcia náradia pred použitím**
	rastová fáza a obdobie	1 krát za deň až pred každým použitím
	počet za vegetáciu (min., max.)	1 strom
Koncentrácia roztoku octu použitého na dezinfekciu		0,4 %***
Príprava roztoku	ocot 8 %	0,05 l
	voda	0,95 l
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		čakacia doba 30 sekúnd po umytí

*Vyjadrené ako kyselina octová.

**Dezinfekcia náradia použitého pred pílením alebo rezaním stromov.

***Vyjadrené ako kyselina octová, pri príprave roztoku je potrebné 50 ml 8 % octu zriediť s 950 ml vody.