

Plodina alebo okolnosti		<b>uhorka siata</b> ( <i>Cucumis sativus</i> )
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		G – použitie v skleníku F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		<b>múčnatka uhorková</b> (pôvodcovia ochorenia napr.: <i>Podosphaera xanthii</i> , <i>Podosphaera fusca</i> , <i>Podosphaera fuliginea</i> , <i>Golovinomyces cichoracearum</i> , <i>Golovinomyces orontii</i> , <i>Leveillula cucurbitacearum</i> , príp. iní pôvodcovia)  <b>padanie klíčnych rastlín uhorky</b> (pôvodca ochorenia napr. <i>Pythium</i> spp.)
Praslička	formulácia	D – suchá rastlina
	obsah účinnej látky	1000 g/kg*
Aplikácia	druh metódy	mulčovanie
	rastová fáza a obdobie	nie je dôležitá
	počet za vegetáciu (min., max.)	1
	interval medzi aplikáciami (min.)	-
Aplikačná dávka	praslička	9 kg
	mulč	100 kg
Ochranná doba		nie je dôležitá
Poznámky		Zvyčajne sa neaplikuje celoplošne, ale len pod rastliny (v riadkoch).

\* Vysušené rastliny prasličky tvoria zložku mulču, sú vmiešané do materiálu použitého na mulčovanie.