

|   |   |   |
|---|---|---|
| Plodina alebo okolnosti   | <b>čakanka štrbáková</b><br><i>(Cichorium endivia L.)</i>     |   |
| Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I) | F – použitie vonku alebo na poli<br>G – použitie v skleníkoch |   |
| Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov  | <b><i>Alternaria cichorii</i></b>                             |   |
| Lecitíny  | formulácia  | EC – emulzný koncentrát   |
|   | obsah účinných látok  | 990 – 1 000 g/kg  |
| Aplikácia   | druh metódy   | postrek   |
|   | rastová fáza a obdobie  | od klíčnych listov celkom vyvinutých (BBCH 10)<br>do plnej zrelosti (BBCH 89) |
|   | počet za vegetáciu (min., max.)                               | 2 – 6   |
|   | interval medzi aplikáciami (min.)                             | 7 dní   |
| Aplikačná dávka   | lecitíny  | 0,15 kg/hl  |
|   | lecitíny  | 1,50 – 2,25 kg/ha   |
|   | voda  | 1 000 – 1 500 l/ha  |
| Ochranná doba   | 5 dní   |   |