

Plodina alebo okolnosti		mnoho okrasných rastlín vrátane: rod javor (<i>Acer</i>) rod skalník (<i>Cotoneaster</i>) rod bršlen (<i>Euonymus</i>) rod zlatovka (<i>Forsythia</i>) rod magnólia (<i>Magnolia</i>) rod pajazmín (<i>Philadelphus</i>) rod topoľ (<i>Populus</i>) rod slivka (<i>Prunus</i>) rod hruška (<i>Pyrus</i>) rod ruža (<i>Rosa</i>) rod ostružina (<i>Rubus</i>) rod orgován (<i>Syringa</i>) rod brusnica (<i>Vaccinium</i>)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		bakteriálna spála, baktériové odumieranie <i>(Pseudomonas syringae pv. Syringae)</i>
Ocot	formulácia	kvapalina na dezinfekciu náradia
	obsah účinných látok	80 g/l (8 %)*
Aplikácia	druh metódy	dezinfekcia náradia pred použitím**
	rastová fáza a obdobie	1 krát za deň až pred každým použitím
	počet za vegetáciu (min., max.)	1 strom
Koncentrácia roztoku octu použitého na dezinfekciu		0,4 %***
Príprava roztoku	ocot 8 %	0,05 l
	voda	0,95 l
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		čakacia doba 30 sekúnd po umytí

*Vyjadrené ako kyselina octová.

**Dezinfekcia náradia použitého pred pílením alebo rezaním stromov.

***Vyjadrené ako kyselina octová, pri príprave roztoku je potrebné 50 ml 8 % octu zriediť s 950 ml vody.