

**Použitie proti hmyzu**

Plodina alebo okolnosti		kapustovité <b>kapusta obyčajná</b> ( <i>Brassica oleracea</i> ) <b>kapusta repková</b> ( <i>Brassica napus</i> ) <b>red'kev siata</b> ( <i>Raphanus sativus</i> )	
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli	
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		<b>skočka kapustová</b> ( <i>Phyllotreta nemorum</i> )	
Macerát z prhľavy	formulácia	DC – dispergovateľný koncentrát*	
	obsah účinnej látky	75 g/l (čerstvá prhľava) alebo 15 g/l (suchá hmota)	
Aplikácia	druh metódy	postrek	
	rastová fáza a obdobie	jar – leto do 9 a viac pravých listov plne vyvinutých (BBCH 19)	
	počet za vegetáciu (min., max.)	1 – 6	
	interval medzi aplikáciami (min.)	min. 7 dní, bežne 15 dní	
Dávka postreku		300 – 500 l/ha**	
Príprava postreku	pri dávke postreku	300 l	500 l
	macerát z prhľavy	60 l	100 l
	voda	240 l	400 l
Ochranná doba		7 dní	
Poznámky		-	

\*Macerát je rastlinný homogenát extrahovaný studenou vodou, filtrovaný (na použitie 5-násobne riedený).

\*\*Pri príprave postreku dodržať 5-násobné riedenie macerátu, pomer riedenia je 1:4 (1 diel macerátu + 4 diely vody).