

Plodina alebo okolnosti		rod brest – všetky druhy okrem hybridu Lutéce (<i>Ulmus</i> spp.)
Použitie vonku alebo na poli (F), použitie v skleníkoch (G) alebo v interiéroch (I)		F – použitie vonku alebo na poli
Regulovaní škodcovia alebo skupina škodcov		huby napádajúce cieвне звázky rod ophiostoma – všetky druhy (<i>Ophiostoma</i> spp.)
Ocot	formulácia	kvapalina na dezinfekciu náradia
	obsah účinných látok	80 g/l (8 %)*
Aplikácia	druh metódy	dezinfekcia náradia pred použitím**
	rastová fáza a obdobie	1 krát za deň až pred každým použitím
	počet za vegetáciu (min., max.)	1 strom
Koncentrácia roztoku octu použitého na dezinfekciu		0,4 %***
Príprava roztoku	ocot 8 %	0,05 l
	voda	0,95 l
Ochranná doba		žiadna
Poznámky		čakacia doba 30 sekúnd po umytí

*Vyjadrené ako kyselina octová.

**Dezinfekcia náradia použitého pred pílením alebo rezaním stromov.

***Vyjadrené ako kyselina octová, pri príprave roztoku je potrebné 50 ml 8 % octu zriediť s 950 ml vody.